

JÓ HA TUDOD...

MILYEN TÉVHITEK VANNAK A KÖZTUDATBAN A KULLANCSCSÍPÉSRŐL 2. rész

- *A kullancsok a fák ágairól ránk esnek, ugranak vagy akár repülhetnek is* - A kullancsok nem másznak fára, maximum 1 méter magasságig jutnak. Leggyakrabban a fűből jönnek elő, vagy kisebb bokrok ágairól sodorjuk le őket, így kerülnek ránk.
- *Ha valaki kapott kullancs ellen védőoltást, nem kaphat el semmilyen fertőzést* - A védőoltás csak a ritkább, de súlyosabb betegségtől, a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladástól véd.
- *A Lyme-kór biztos, ha a csípés körül piros kör jelenik meg* - Az esetek többségében van, de előfordul olyan fertőzés is, amit nem előzött meg a tipikus Lyme-kór. Közvetlenül az eltávolítás után akár 2-3 napig is bőrpír jelentkezhet, ez egy természetes gyulladásos folyamat része, még nem utal fertőzésre. Ha nem múlik el, mutassuk meg orvosnak. Ha egy hétig, vagy akár hónapokig is látható a körkörös piros folt, az már a fertőzés egyik jele lehet.
- *A Lyme-kór ellen nincs védelem* - Minél előbb észrevesszük a kullancsot és eltávolítjuk, annál kevesebb az esély, hogy megfertőző. Fontos, hogy az eltávolításkor használjunk csipeszt, és semmiképpen ne nyomjuk össze a potrohát, mielőtt kiszedjük a bőrből. A Lyme-kór bakteriális fertőzés, tehát időben felismerve, antibiotikummal kezelve gyógyítható.

JÓ HA TUDOD...

MILYEN TÉVHITEK VANNAK A KÖZTUDATBAN A KULLANCSCSÍPÉSRŐL 2. rész

- *A kullancsok a fák ágairól ránk esnek, ugranak vagy akár repülhetnek is* - A kullancsok nem másznak fára, maximum 1 méter magasságig jutnak. Leggyakrabban a fűből jönnek elő, vagy kisebb bokrok ágairól sodorjuk le őket, így kerülnek ránk.
- *Ha valaki kapott kullancs ellen védőoltást, nem kaphat el semmilyen fertőzést* - A védőoltás csak a ritkább, de súlyosabb betegségtől, a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladástól véd.
- *A Lyme-kór biztos, ha a csípés körül piros kör jelenik meg* - Az esetek többségében van, de előfordul olyan fertőzés is, amit nem előzött meg a tipikus Lyme-kór. Közvetlenül az eltávolítás után akár 2-3 napig is bőrpír jelentkezhet, ez egy természetes gyulladásos folyamat része, még nem utal fertőzésre. Ha nem múlik el, mutassuk meg orvosnak. Ha egy hétig, vagy akár hónapokig is látható a körkörös piros folt, az már a fertőzés egyik jele lehet.
- *A Lyme-kór ellen nincs védelem* - Minél előbb észrevesszük a kullancsot és eltávolítjuk, annál kevesebb az esély, hogy megfertőző. Fontos, hogy az eltávolításkor használjunk csipeszt, és semmiképpen ne nyomjuk össze a potrohát, mielőtt kiszedjük a bőrből. A Lyme-kór bakteriális fertőzés, tehát időben felismerve, antibiotikummal kezelve gyógyítható.