JÓ HA TUDOD...

MI A FIZIKÁLIS LÁZCSILLAPÍTÁS?



A lázas beteget beleültetjük úgy, hogy a víz mellmagasságig érjen. Hideg víz hozzáadásával a fürdő hőmérsékletét fokozatosan 28–31°C-ra hűtjük, közben locsolgatjuk a beteg felsőtestét.

39 ºC felett, ha nem sikerült eredményt elérnünk, HŰTŐFÜRDŐRE van szükség.
A hőközpontra nem hat, hőelvonással csökkenti a lázat. Általában gyógyszeres csillapítással kezdünk, azután kerül sor a hűtőfürdőre.

A priznic a boka és a csukló kis felülete miatt semmit sem ér, ne alkalmazzuk. A teljes test állott vizes borogatása vagy a hűtőfürdő alkalmazása hatásos.
Állott vizes borogatás esetén 10 percenként cseréljük a lepedőt a gyermeken, a hólyagot száraz textíliával védjük. A lázat 38 fokig kell csökkenteni, nagy hőingadozás nem tesz jót. A hűtőfürdőnél fontos, ne legyen túl hideg, mert a hidegben a bőrerek összehúzódnak, ez pedig gátolja a hőleadást, vagyis hőpangás jön létre.
Tilos a fürdőt jeges vízzel végezni! A lázas gyermeket kb. a láz mértékével megegyező vízbe ültetjük, cél, hogy ne fázzon benne. A mellkasáig engedjük a vizet, minél nagyobb felület érintkezzék a vízzel. A kellemes hőmérsékletű vizet keverjük hideggel. Kádban levő gyereket semmi estre se hagyjunk magára. Maximum 15-20 percet legyen a kádban, 30 fok alá ne hűtsük a vizet. Bárányhimlő esetén a hűtőfürdőt nem lehet alkalmazni.
Napszúrásnál a hőközpont nem állítódik át, itt nem lázról van szó. Ebben az esetben a hűtőfürdő használ, ami elősegíti a hőleadást, ami eddig gátolva volt.

A láz kezdeti szakaszában a hidegrázás jelentkezik. Ebben a kezdeti fázisban betakarjuk a gyereket. De amikor a gyermek hőmérséklete megemelkedik, takarjuk ki ugyanis a hőleadás gátlásával tovább emelkedik a hőmérséklet. Fontos, hogy a lázas beteget bőségesen itassuk folyadékkal!

JÓ HA TUDOD...

MI A FIZIKÁLIS LÁZCSILLAPÍTÁS?



A lázas beteget beleültetjük úgy, hogy a víz mellmagasságig érjen. Hideg víz hozzáadásával a fürdő hőmérsékletét fokozatosan 28–31°C-ra hűtjük, közben locsolgatjuk a beteg felsőtestét.

39 ºC felett, ha nem sikerült eredményt elérnünk, HŰTŐFÜRDŐRE van szükség.
A hőközpontra nem hat, hőelvonással csökkenti a lázat. Általában gyógyszeres csillapítással kezdünk, azután kerül sor a hűtőfürdőre.

A priznic a boka és a csukló kis felülete miatt semmit sem ér, ne alkalmazzuk. A teljes test állott vizes borogatása vagy a hűtőfürdő alkalmazása hatásos.
Állott vizes borogatás esetén 10 percenként cseréljük a lepedőt a gyermeken, a hólyagot száraz textíliával védjük. A lázat 38 fokig kell csökkenteni, nagy hőingadozás nem tesz jót. A hűtőfürdőnél fontos, ne legyen túl hideg, mert a hidegben a bőrerek összehúzódnak, ez pedig gátolja a hőleadást, vagyis hőpangás jön létre.
Tilos a fürdőt jeges vízzel végezni! A lázas gyermeket kb. a láz mértékével megegyező vízbe ültetjük, cél, hogy ne fázzon benne. A mellkasáig engedjük a vizet, minél nagyobb felület érintkezzék a vízzel. A kellemes hőmérsékletű vizet keverjük hideggel. Kádban levő gyereket semmi estre se hagyjunk magára. Maximum 15-20 percet legyen a kádban, 30 fok alá ne hűtsük a vizet. Bárányhimlő esetén a hűtőfürdőt nem lehet alkalmazni.
Napszúrásnál a hőközpont nem állítódik át, itt nem lázról van szó. Ebben az esetben a hűtőfürdő használ, ami elősegíti a hőleadást, ami eddig gátolva volt.

A láz kezdeti szakaszában a hidegrázás jelentkezik. Ebben a kezdeti fázisban betakarjuk a gyereket. De amikor a gyermek hőmérséklete megemelkedik, takarjuk ki ugyanis a hőleadás gátlásával tovább emelkedik a hőmérséklet. Fontos, hogy a lázas beteget bőségesen itassuk folyadékkal!